

Trachelomorphus Baudii Seidl. — Connue, en France, seulement du mont Mounier (Alp.-Mar.), cette espèce a été reprise par feu L. VILLARD au col Marry, situé entre Maurin (Basses-Alpes) et la frontière d'Italie.

Cotaster cuneipennis Aubé. — Cette espèce, mise en synonymie de *C. unciipes* Boh. (Cat. Reitter) par J. FAUST, en est parfaitement distincte, ainsi que l'a fait observer A. DOBERO. Capturé en août dernier dans la forêt de Durbon (H^{tes}-Alpes).

Ceuthorrhynchus Pueli Hust. — Un exemplaire pris en fanchant dans les prairies du Villard-d'Arène (H^{tes}-Alpes), 25 juillet 1915.

Ceuthorrhynchus rhenanus Schultze. — Seine-et-Marne : Lagny, sur des Giroflées en fleur; juin !.

Apion austriacum H. Wagn. — Deux exemplaires capturés, à la fin de juillet, à Guillore (H^{tes}-Alpes), sur *Stachelina dubia*. Espèce nouvelle pour la faune française. Elle vit en Autriche sur une autre Composée, *Centaurea nigra* (H. WAGNER).

Baris prasina Bohem. — Espèce méridionale, remontant jusqu'à Dôle (Jura) !.

Baris morio Bohem. — Seine-et-Marne : Lagny, au bord de la Marne !.

Magdalis commixta Rey. — Côte-d'Or : Darois, près Dijon !.

Rhynchites (Deporaus) Mannerheimi Humm. — Seine-et-Marne : Lagny, au bois de Chigny, et bois des Ferrières. Sur les jeunes rejetés de *Betula alba*.

Description de deux *Simulies* nouvelles des hautes régions de l'Afrique tropicale [DIPT. TIPUL.]

par E. ROUBAUD.

Simulium Neavei, n. sp. — ♀ Grande espèce sombre, noirâtre, à pilosité gris jaunâtre uniforme, peu dense. Antennes noires, légèrement pubescentes, la base plus claire. Face et front gris à pilosité dorée. Thorax noirâtre en dessus, sans reflet argenté, peu densément couvert de pilosité jaunâtre. Flancs gris ardoise. Balanciers jaunâtres. Ailes à nervation forte; la base rougeâtre.

Abdomen noirâtre, terne, uniformément couvert d'une pilosité

jaunâtre disposée en petites touffes. Pas de distinction d'aspect entre les segments antérieurs et les postérieurs.

Pattes noires, la moitié proximale des fémurs, des tibias et des métatarses moyens et postérieurs couverte d'un revêtement pileux jaune doré, dense et nettement délimité. Tarses antérieurs complètement noirs, grêles, non dilatés. Griffes simples partout.

Longueur : 2,5 mm.

♂ Inconnu.

Collection du British Museum : 13 exemplaires recueillis par S. NEAVE dans l'Ouganda entre 4 et 5.000 pieds d'altitude (W. Ankole, 4.500-5.000 pieds, et rivière Yala 4.800-5.300 pieds).

Cette espèce offre l'aspect de certaines femelles de *S. aureum* Fries, mais elle se distingue immédiatement des *Simulies* de ce groupe par ses griffes simples, dépourvues de dents, du type *reptans*. Elle s'éloigne, d'autre part, des espèces de ce type par ses tarses antérieurs grêles et son abdomen dépourvu de ceinture antérieure. Voisine de *S. Wellmanni* Roub. (1) et du même groupe, elle en diffère par des dimensions beaucoup plus grandes, l'absence de reflet gris au thorax et sa pilosité jaune pâle uniforme.

***Simulium dentulosum*, n. sp.** — ♀ D'un noir brun terne, uniforme, à pilosité jaunâtre clairsemée.

Face et front gris clair ; antennes noires, la base testacée. Thorax en entier noir terne, orné de rares poils dorés en avant. Pas de reflet argenté. Flancs ardoisés. Balanciers roussâtres.

Abdomen noir brun, les premiers segments à coloration mate, les derniers plus brillants. Collerette de poils dorés bien développée au bord postérieur du premier segment, sur les côtés.

Pattes testacées ; l'extrémité des fémurs marquée d'une tache brune oblique nettement délimitée ; celle des tibias fortement nuancée de brun. Tarses noirs, les antérieurs grêles, non dilatés. Les métatarses postérieurs clairs sauf à l'extrémité. Expansion métatarsienne longue, atteignant le niveau de l'incision du 1^{er} tarsien (fig. 1).




Fig. 1 et 2. — Patte post. et griffe de *S. dentulosum*.

(1) *Bull. Mus. d'Hist. nat.* [1906], p. 519.

Griffes fortes, du type *replans*, mais *pourvues à la base d'une denticulation courte, conique, dirigée dans le sens de la griffe* (fig. 2).

Longueur : 3 mm.

Coll. du British Museum, 7 exemplaires recueillis par S. NEAVE et portant les indications d'origine suivantes : Brit. E. Afr., pentes Sud-Est du Kenya, 6-7.000 pieds, et Ouganda, Siroko riv., au pied du mont Elgon, 3.600 pieds.

M. J. BEQUAERT a recueilli la même espèce en assez grand nombre sur les pentes occidentales du Rouwenzori à 2.000 mètres d'altitude. Ses exemplaires ne diffèrent de ceux de l'Afrique anglaise que par une coloration mate uniforme à l'abdomen.

Cette *Simulia*, par la constitution très caractéristique de ses griffes, se classe à côté de l'espèce africaine si répandue *S. damnosum* Theob., mais, indépendamment de son habitus général, les tarses antérieurs grêles suffisent à l'en distinguer. Elle se différencie d'autre part de *S. Neavei* par ses pattes non entièrement sombres et ses griffes denticulées.

Ces deux espèces semblent spéciales aux hautes régions (1.000 à 2.000 m.) de l'Afrique équatoriale.

Deux *Calliphorinae* nouveaux d'Afrique [DIPT. MUSCIDAE],

par le Dr J. VILLENEUVE.

Gen. *Ochromelinda*, nov. gen.

Quoique paraissant appartenir au même groupe de *Calliphorinae* que le genre *Pericallimya*, le genre *Ochromelinda* s'en écarte notablement par la chétotaxie du thorax et occupe, de ce fait, une place à part.

Dans le groupe *Calliphora-Onesia-Pericallimya*, etc., les soies du thorax ont un arrangement constant : il y a, par exemple, 2 paires de soies acrosticales, l'antérieure et l'intermédiaire, au-devant de la suture ; 3 paires après la suture ; on ne compte que 2 soies intraalaires rétrosuturales.

Chez *Ochromelinda*, la paire antérieure des soies acrosticales disparaît de part et d'autre de la suture, en sorte qu'au devant de cette dernière il ne demeure que la paire intermédiaire et, en arrière, il ne reste que la paire intermédiaire et la paire postérieure. En outre, il y a addition d'une soie intraalaire antérieure, ce qui porte à 3 le nombre des soies intraalaires rétrosuturales. Les soies sternopleurales = $2 + 1$.